



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

KEVZARA[®]
(sarilumabi) injektio

KUTSU 23.1.2019

**STRY:N VUOSIKOKOUKSEN
SATELLIITTISYMPOSIUM**

SRY:N VUOSIKOKOUKSEN satelliittisymposium

Arvoisa Reumatologi,

Kutsumme teidät Sanofi Genzymen järjestämään satelliittisymposiumiin.

Aika: keskiviikkona 23.1.2019 klo 17.15–22.00

Paikka: Solo Sokos Hotelli Tornī, Tampere

Ilmoittautumiset: Ilmoittauduthan ystävällisesti Sanofi Genzymen satelliittisymposiumiin SRY:n vuosikokouksen ilmoittautumislinkin kautta.

Ystävällisin terveisin,
Sanofi Genzymen Immunologian tiimi

Matkustusasiat

Paula Priha-Kiiskinen
markkinointikoordinaattori
paula.priha-kiiskinen@sanofi.com
puh. 040 656 9373

Muut tilaisuutta koskevat kysymykset

Karoliina Tuominen
kenttätuotepäällikkö
karoliina.tuominen@sanofi.com
puh. 040 552 2620

Ohjelma

- 17.15 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
- 17.30 Tilaisuuden avaus
Sanofi Genzyme ja puheenjohtaja, LT, reval. Antti Palomäki
- 17.35 Cardiovascular Comorbidity in Inflammatory Rheumatological Conditions
Prof. Jürgen Braun, Saksa
- 18.20 Clinical Data of Sarilumab
Sanofi Genzyme Medical Affairs
- 19.05 Kokemuksia sarilumabista - potilastapauksia
Esa Rouhe, Reumatologi, Seinäjoen keskussairaala
- 19.35 Tiimityö ja motivaatio - Luovan ajattelun kautta uusia toimintatapoja tiimityöhön
Patrick "Pata" Degerman, Löytöretkeilijä
- 20.20 Tilaisuuden yhteenveto
Puheenjohtaja, LT, reval. Antti Palomäki
- 20.30 Illallinen
- 22.00 Tilaisuus päättyy



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

KEVZARA[®] (sarilumabi) injektioneste, liuos kerta-annoskynässä annoksina 150 mg/1,14 ml ja 200 mg/1,14 ml.

Käyttöaiheet: KEVZARA on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä metotreksaatin (MTX) kanssa keskivaikean tai vaikean aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille, joilla ei ole saatu riittävää vastetta yhdellä tai useammalla taudinkulkua muuttavalla reumalääkkeellä (DMARDs) tai jotka eivät siedä niitä. KEVZARA-valmistetta voidaan antaa monoterapiana, jos metotreksaattia ei siedetä tai se ei ole sopiva. **Annostus ja antotapa:** Suositeltu KEVZARA-annos on 200 mg joka toinen viikko ihonalaisena injektiona. Annoksen pienentämistä 200 mg:sta 150 mg:aan joka toinen viikko suositellaan, kun on tarpeen hallita neutropeniaa, trombosytopeniaa tai kohonneita maksaentsyymiarvoja. **Vasta-aiheet:** Aktiiviset, vaikeat infektiot. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai valmisteen apuaineille. **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitimet:** Potilaita on tarkkailtava huolellisesti infektion merkkien ja oireiden varalta KEVZARA-hoidon aikana. Maha-suolikanavan perforaatioita voi ilmetä. **Yhteisvaikutukset:** Metotreksaatin samanaikainen anto ei vaikuttanut sarilumabialtistukseen eikä metotreksaattialtistus muuttunut samanaikaisen sarilumabiannon takia. KEVZARA-valmisteen käyttöä yhdessä Janus-kinaasin (JAK) estäjien tai biologisten DMARD-lääkkeiden, kuten TNF (Tumor Necrosis Factor) -salpaajien, kanssa ei ole tutkittu. Sarilumabin kyvyllä muuntaa IL-6:n vaikutusta CYP-entsyymeihin saattaa olla kliinistä merkitystä käytettäessä CYP-substraatteja, joiden terapeuttinen indeksi on kapea ja annos säädetään potilaskohtaisesti. KEVZARA-hoitoa aloitettaessa tai lopetettaessa on tarpeen seurata hoidon vaikutusta (esim. varfariinin kohdalla) tai lääkepitoisuutta (esim. teofylliinin kohdalla) ja muuttaa lääkevalmisteen annosta potilaskohtaisesti. Varovaisuutta on noudatettava, jos potilas aloittaa KEVZARA-hoidon käyttäessään CYP 3A4 -substraatteja (kuten ehkäisytabletteja tai statiineja). **Haittavaikutukset:** Hyvin yleiset: Neutropenia. Yleiset: Ylähengitystieinfektiot, virtsatieinfektiot, nasofaryngiitti, huuliherpes, trombosytopenia, hyperkolesterolemia, hypertriglyseridemia, suurentuneet trans-aminaasiarvot, pistoskohdan punoitus ja kutina. **Korvattavuus:** Reseptivalmiste, peruskorvattavuus 1.3.2018 alkaen aktiivisen nivelreuman hoitoon (313). **Pakkaukset:** esitätetty kynä 150 mg 2 kpl/pkt, esitätetty kynä 200 mg 2 kpl/pkt, esitätetty ruisku 200 mg 1 kpl/pkt. **Hinnat:** esitätetty kynä 2 kpl/pkt 150 mg tai 200 mg (1,14 ml) 855,10 € (TMH), 1074,99 € (VMH + alv) ja esitätetty ruisku 1 kpl/pkt 200 mg (1,14 ml) 427,55 € (TMH), 557,66 € (VMH + alv). **Lisätiedot:** Valmisteyhteenveto 2017, Pharmaca Fennica tai Sanofi Oy, Revontulenkujia 1, 02100 Espoo. Puh 0201 200 300.